





Katarakt/ grå stær

Hvad er katarakt?

Øjets naturlige linse bryder indkommende lysstråler, hvilket gør det muligt for os at se. Øjets linse skal være klar, for at lyset bedst brydes. Ved katarakt (også kaldet grå stær) er linsen derimod uklar, og synet kan opleves som sløret, tåget og mindre farverigt.




I det normale øje vil den klare linse gøre, at lyset brydes korrekt ind på nethinden (retina).



Ved katarakt spredes lyset uhensigtsmæssigt på retina, og synet bliver uklart.

Hvad er symptomerne på katarakt?

- Sløret/tåget syn
- Dobbeltsyn
- Lysfølsomhed
- Dårligt syn i nattetimerne eller behov for ekstra lys ved læsning
- Lyse farver opleves som falmende eller gule i stedet



Sløret eller svagt syn



Katarakt/ grå stær

Hvad skyldes katarakt?

Aldring er den mest hyppige årsag til katarakt og skyldes normale øjenforandringer begyndende fra omkring 40-årsalderen. Med alderen vil proteiner i øjets linse begynde at nedbrydes, hvilket forårsager uklarheder i linsen. Typisk er det dog først ved 60-årsalderen, at linsen begynder at blive uklar. Problemer med synet vil i nogle tilfælde først indtræde flere år senere.

Andre årsager til katarakt kan være:

- Genetisk disposition
- Andre sygdomme f.eks. diabetes
- Tidligere øjenskade, øjenoperation eller strålebehandling på den øverste del af kroppen
- Brug af nogle former for medicin, såsom kortikosteroider, kan forårsage tidlig katarakt

Aldersbetinget katarakt udvikler sig gradvist og langsomt mens andre former for katarakt bl.a. forårsaget af diabetes kan udvikle sig hurtigere. Vi kan ikke forudsige, hvor hurtigt din katarakt vil udvikle sig.

Hvordan behandler man katarakt?

Katarakt kan kun fjernes operativt. Hvis du ikke er meget generet af katarakt, er det ikke nødvendigt at få det fjernet. Måske har du blot brug for nye brilleglas for at se bedre. Du bør til gengæld overveje en operation, hvis katarakten er hæmmende for dig i hverdagen.

Hvor behandler man katarakt?

Du kan blive henvist til kataraktoperation på Glostrup Hospital. Det er gratis og der er en behandlingsgaranti på 2 måneder. Hos Øjenlægerne på Rådhuspladsen opererer vi også for grå stær/katarakt og du kan forvente at få en tid til operation indenfor 2 uger. Vi indsætter både enkeltstyrke og flerstyrke linser. Herudover kan vi også behandle bygningsfejl ved operationen. Du er altid velkommen til at spørge os, hvis du har brug for mere information.





Katarakt/ grå stær

Hvordan foregår en katarakt-operation?

Ved en kataraktoperation vil man udskifte den uklare linse med en kunstig linse kaldet en intraokulær linse (IOL). Hvis en operation bliver aktuel, vil vi tale med dig om, hvilken type IOL der passer til dig.

Den almindelige sygesikring dækker behandling med enkeltstyrke IOL samt hvis du har en høj bygningsfejl (mere end 2D).

Hos Øjenlægerne på Rådhuspladsen behandler vi både med enkeltstyrke og flerstyrke IOL. Desuden kan du få behandlet din bygningsfejl, selvom den er lavere end 2 dioptrier.

Efterstær

I nogle tilfælde kan synet et par år efter en kataraktoperation blive sløret igen. Dette kan skyldes, at øjenkapslen, som er den del af øjet, der holder den nye linse på plads, kan blive uklare. Dette benævnes også efterstær. Efterstær kan behandles med laser også kaldet (capsulotomi).

Opsummering

Katarakt skyldes, at øjets naturlige linse bliver uklare og synet kan derfor opleves som sløret, tåget og mindre farverigt. Katarakt behandles ved en operation, hvor den uklare linse bliver erstattet af en ny kunstig linse. En operation er dog ikke nødvendig, hvis symptomerne ikke er til gene. Man bør overveje en operation, hvis katarakten er hæmmende i hverdagen.

Kontakt

Har du spørgsmål til Øjenlægerne på Rådhuspladsen er du velkommen til at kontakte os dagligt mellem 8.15-11.30 på tlf: 38289388. Der er som regel størst telefontravlhed mellem kl. 8.15-10. Alternativt kan du sende os en e-mail til info@eyedoctor.dk